

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov
SERENADE® ASO

Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou určený na ochranu poľných plodín, zeleniny, viniča, ovocných stromov, drobného ovocia, liečivých rastlín a okrasných rastlín proti hubovým chorobám a k posilneniu odolnosti rastlín.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Bacillus subtilis, kmeň QST 713	13,96 g/l 1,396 % hm	minimálne $1,042 \times 10^{12}$ CFU/l
------------------------------------	--------------------------------	--

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Označenie prípravku sa nepožaduje

Výstražné slovo sa nepožaduje

EUH208 Obsahuje *Bacillus subtilis*. Môže vyvolat' alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaným pracovným odev z pracoviska.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P284 V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečist'ujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vód/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relativne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

**Za účelom ochrany vodných organizmov dodržiavajte neošetrenú zónu 15 m od brehu.
Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdvojov pitných vôd!**

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte určenú ochrannú zónu!

Zákaz vylievania zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITELSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ
ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

Držiteľ autorizácie: Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **16-06-1717**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 1 l HDPE fl'aša
5 l a 10 l HDPE kanister

SERENADE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/h a	Ochranná doba	Poznámka
baklažán, rajčiak, paprika	pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť	8 l	AT	poľné použitie, skleníky, fóliovníky
mrkva	múčnatka mrkvová, alternáriová škvrnitosť listov mrkvy	8 l	AT	poľné použitie
jahoda	pleseň sivá	8 l	AT	skleníky, fóliovníky
šalát	pleseň sivá, biela hniloba	8 l	AT	poľné použitie

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravkom ošetrujte preventívne, najneskôr pri prvom výskyti choroby.

Baklažán, paprika, rajčiaky

Dávka vody: 500 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 – 14 dní

Proti plesni sivej a alternáriovej škvrnitosti ošetrujte od rastovej fázy začiatku rastu bočných výhonov, do rastovej fázy plnej zrelosti (BBCH 21 - 89).

Mrkva

Dávka vody: 200 – 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 – 14 dní

Proti alternáriovej škvrnitosti listov a múčnatke mrkvovitých ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5 cm po rastovú fázu, kedy korene dosiahli typický tvar a veľkosť (BBCH 41 - 49).

Jahody

Dávka vody: 300 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 – 14 dní

Proti plesni sivej ošetrujte od začiatku kvitnutia, do zberu plodov (BBCH 60 - 89).

Šalát

Dávka vody: 250 – 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 5x

Interval medzi aplikáciami: 5 – 14 dní

Proti plesni sivej a bielej hnilobe ošetrujte od rozvinutého 3. pravého listu, do rastovej fázy typickej veľkosti a tvaru hlávok (BBCH 13 - 49).

Menej významné použitie prípravku podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:**NÁVOD NA POUŽITIE**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
vinič	pleseň sivá	4 - 8 l	AT	
vinič	kyslá hniloba hrozna	4 - 8 l	AT	
repka ozimná repka jarná horčica slnečnica mak	pleseň sivá biela hniloba alternáriová škvrnitosť	2 - 4 l	AT	
repka ozimná repka jarná horčica slnečnica mak	fómová hniloba	2 - 4 l	AT	
repa cukrová repa kŕmna	cerkosporióza repy múčnatka repová	2 - 4 l	AT	

pšenica ozimná	fuzariózy klasov	2 - 4 l	AT	
pšenica jarná				
pšenica tvrdá				
pšenica špaldová				
jačmeň ozimný				
jačmeň jarný				
ovos				
pšenica ozimná	múčnatka trávová	2 - 4 l	AT	
pšenica jarná	hrdza pšeničná			
pšenica tvrdá	hrdza plevová			
pšenica špaldová	septorióza pšenice			
raž				
tritikale				
jačmeň ozimný	múčnatka trávová	2 - 4 l	AT	
jačmeň jarný	hrdza jačmenná			
ovos	hnedá škvrnitost' jačmeňa			
zemiak	koreňomor ľuľkový	5 l	AT	
	striebリスト' šupky			
zemiak	hnedá škvrnitost' listov	4 - 8 l	AT	
kôstkoviny (čerešňa, višňa, slivka, marhuľa, broskyňa, nektarinka)	moniliózy bakteriová spála ovocných stromov plešeň sivá bakteriálna škvrnitost' kôstkovín	4 - 8 l	AT	
jadroviny	bakteriálna spála plešeň sivá stemfyliová škvrnitost' hrušky	4 - 8 l	AT	
chmel'	múčnatka chmel'ová	4 - 8 l	AT	
cvikla repa žltá repa sladkastá repa ružovkastá	cerkosporióza repy múčnatka repová	2 - 4 l	AT	
hrach fazul'a bôb lupina sója peluška	plešeň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	hrach na zrno fazul'a na zrno
hrach fazul'a	plešeň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	hrach na zeleno a lusky fazul'a na lusky
rasca požlt farbiarsky	plešeň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	
jahoda	plešeň sivá múčnatka jahôd	4 - 8 l	AT	
šalát	plešeň sivá sclerotiniová hniloba šalátu	4 - 8 l	AT	skleník

tekvicová zelenina	pleseň sivá múčnatka uhorková	4 - 8 l	AT	skleník, pole
kapusta brokolica karfiol kapustová zelenina	pleseň sivá biela hniloba alternária kapustová	4 - 8 l	AT	skleník, pole
red'kovka red'kev olejnatá	biela hniloba alternária kapustová	4 - 8 l	AT	skleník, pole
petržlen paštrnák zeler	alternáriová škvŕnitosť múčnatka pleseň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	
zeler stonkový	alternáriová škvŕnitosť múčnatka pleseň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	skleník, pole
špargľa	pleseň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	
pór	alternáriová škvŕnitosť póru	4 - 8 l	AT	
cibul'a	botrytída listov	4 - 8 l	AT	
liečivé rastliny	pleseň sivá biela hniloba alternáriová škvŕnitosť múčnatka	4 - 8 l	AT	skleník, pole
malina černica ríbezľa červená ríbezľa čierna egreš čučoriedka	pleseň sivá americká múčnatka egreša	4 - 8 l	AT	skleník, pole
špenát listová zelenina	pleseň sivá biela hniloba	4 - 8 l	AT	skleník, pole
okrasné rastliny okrasné dreviny	pleseň sivá biela hniloba alternáriová škvŕnitosť múčnatka ruže múčnatka	4 - 8 l	AT	skleník, pole
ovocné škôlky okrasné škôlky	hubové choroby, bakteriozy	4 - 8 l	AT	skleník, pole

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokial' ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)

Vinič

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie – pleseň sivá : 6x

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie – kyslá hniloba hrozna (*Acetobacter spp.*): 4x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) ošetrujte od štátia metliny do zberovej zrelosti (BBCH 53 - 89).

Proti kyslej hnilobe hrozna (*Acetobacter spp.*) ošetrujte od štátia zatvoreného strapca do zberovej zrelosti hrozna (BBCH 79 – 89).

Repka ozimná, repka jarná, horčica, slnečnica, mak

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*), bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) a alternáriovej škvrnitosti (*Alternaria spp.*) ošetrujte od fázy 2 listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89).

Proti fómovej hnilobe (*Phoma lingam*) ošetrujte: jesenná aplikácia v štádiu 4 – 9 listov (BBCH 14-19); jarná aplikácia od začiatku predĺžovacieho rastu do tvorby kvetných pukov (BBCH 30 – 51)

Repa cukrová, repa kŕmna

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti cerkosporioze repy (*Cercospora beticola*) a múčnatke repovej (*Erysiphe beta*) ošetrujte od začiatku zapojenia rastlín v riadkoch do zberovej zrelosti koreňa repy (BBCH 31 - 49).

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti fuzariózam klasov (*Fusarium spp.*) ošetrujte od konca klasenia do konca kvitnutia (BBCH 59 - 69).

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, raž , tritikale

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 4x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti múčnatke trávovej (*Erysiphe graminis*), hrdzi pšeničnej (*Puccinia recondita*), hrdzi plevovej (*Puccinia striiformis*) a septorioze pšenice (*Mycosphaerella graminicola*) ošetrujte od fázy plného odnožovania do konca klasenia (BBCH 25 - 59).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 4x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti múčnatke trávovej (*Erysiphe graminis*), hrdzi jačmennej (*Puccinia hordei*) a hnedej škvrnitosti jačmeňa (*Pyrenophora teres*) ošetrujte od fázy plného odnožovania do konca klasenia (BBCH 25 - 59).

Zemiak – aplikácia pri výsadbe do brázdy

Dávka vody: 100 – 200 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x

Proti koreňomoru ľuľkovému (*Rhizoctonia solani*) a striebリストi šupky (*Helminthosporium solani*) aplikujte pri výsadbe do brázdy.

Zemiak

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti hnedej (alternáriovej) škvrnitosti (*Alternaria* spp.) aplikujte od začiatku zapojenia rastlín v riadkoch do hnedastého sfarbenia bobúľ na vňati (BBCH 31 - 85).

Kôstkoviny (čerešne, višne, slivky, marhule, broskyne, nektarinky)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti monílovej spále kôstkovín (*Monilinia laxa*), bakteriálnej spále (*Pseudomonas syringae*), plesni sivej (*Botrytis cinerea*), bakteriálnej škvrnitosti kôstkovín (*Xanthomonas arboricola*) a monílovej hnileobe plodov (*Monilinia fructigena*) ošetrujte od nalievania kvetných púčikov po zberovú zrelosť (BBCH 51 - 89).

Jadroviny

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti bakteriálnej spále (*Erwinia amylovora*), ošetrujte od fázy prvých listov rozvinutých do obdobia tesne pred zberovou zrelosťou (BBCH 13 - 85).

Proti stemfyllovej (hnedej) škvrnitosti hrušky(*Stemphylium vesicarium*) ošetrujte od fázy myšieho uška (BBCH 10).

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) ošetrujte od fázy nalievania kvetných pukov do obdobia druhého opadávania plodov (BBCH 51 - 73).

Chmel'

Dávka vody: 700 – 2000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti mûčnatke chemľu (*Sphaerotheca humuli*) ošetrujte od fázy 2. páru listov rozvinutých do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89).

Cvikla (repa obyčajná pravá kŕmna cviklová), repa žltá (repa obyčajná pravá kŕmna žltá/repa šalátová), repa sladkastá (repa obyčajná pravá kŕmna zeleninová sladkastá), repa ružovkastá (repa obyčajná pravá kŕmna zeleninová ružovkastá)

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti cerkosporióze repy (*Cercospora beticola*) a mûčnatke repovej (*Erysiphe beta*e)ošetrujte od začiatku zapojenia rastlín v riadkoch do zberovej zrelosti koreňa repy (BBCH 31 - 49).

Hrach na zrno, fazuľa na zrno, bôb, lupina, sója, peluška

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia vyvinutých dvoch pravých listov po zberovú zrelosť (BBCH 12 - 89).

Hrach na zeleno a lusky, fazuľa na lusky

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia vyvinutých dvoch pravých listov po štadium strukov s typickou (konečnou) dĺžkou (BBCH 12 - 79).

Rasca lúčna, pozlt farbiarsky

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov po zberovú zrelosť (BBCH 12 - 89).

Jahoda

Dávka vody: 700 – 2000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a múčnatke jahôd (*Sphaerotheca macularis*) ošetrujte od štátia viditeľného 1. súboru kvetov v dolnej časti ružice do štátia zberovej zrelosti (BBCH 55 - 89).

Šalát (skleník)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a sclerotiniovej hnilobe šalátu (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia vyvinutých 3 pravých listov do dosiahnutia typickej veľkosti, tvaru a pevnosti hlávky (BBCH 13 - 49).

Tekvicová zelenina (skleník, pole)

Dávka vody: 600 – 2000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a múčnatke uhorkovej (*Sphaerotheca fuliginea*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89).

Kapusta, brokolica, karfiol, ostatná polná kapustová zelenina (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*), bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) a alternáriii kapustovej (*Alternaria brassicae*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do typickej zberovej veľkosti konzumovanej časti plodiny (BBCH 12 - 49).

Red'kovka, red'kev (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) a alternáriii kapustovej (*Alternaria brassicae*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do typickej zberovej veľkosti buliev (BBCH 12 - 49).

Petržlen, paštrnák, zeler buľovový

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti suchej škvrnistosti listov (*Alternaria spp.*), múčnatke (*Erysiphe spp.*), plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotinum*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do štátia zberovej veľkosti koreňa a buliev (BBCH 12 - 49).

Zeler stonkový (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti suchej škvrnistosti listov (*Alternaria spp.*), múčnatke (*Erysiphe spp.*), plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotinum*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do štátia zberovej veľkosti listov (BBCH 12 - 49).

Špargľa

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia vyvinutých 2 pravých listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 49).

Pór

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti alternáriiovej škvrnitosti póru (*Alternaria porri*) ošetrujte od štátia dvoch listov do konečného vzrastu typického pre zber (BBCH 12 - 49).

Cibul'a

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti škvrnitosti listov cibule a krčkovej hnilobe (*Botrytis squamosa*) ošetrujte od štátia dvoch listov do zberovej veľkosti cibule (BBCH 12 - 49).

Liečivé rastliny (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*), bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*), alternáriiovej škvrnitosti (*Alternaria spp.*) a múčnatke (*Erysiphe spp.*) ošetrujte od štátia dvoch listov do zberovej veľkosti rastlinných časťí (BBCH 12 - 49).

Malina, černica, ríbezľa červená, ríbezľa čierna, egreš, čučoriedka (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1200 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a americkej múčnatke egreša (*Sphaerotheca morsuviae*) ošetrujte od štátia nalievania kvetných púčikov do začiatku dozrievania (BBCH 51 - 85).

Špenát, zelenina listová (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*) a bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) ošetrujte od štátia troch pravých listov do dosiahnutej typickej zberovej hmotnosti listov (BBCH 13 - 49).

Okrasné rastliny, okrasné dreviny (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1200 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti plesni sivej (*Botrytis cinerea*), bielej hnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*), alternáriovej škvŕnitosti *Alternaria spp.*), múčnatke ružovitých (*Sphaerotheca pannosa*) a múčnatke (*Erysiphe spp.*) ošetrujte od štátia dvoch pravých listov do začiatku dozrievania (BBCH 12 - 85).

Ovocné škôlky, okrasné škôlky (skleník, pole)

Dávka vody: 200 – 1200 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Proti hubovým chorobám a bakteriázam ošetrujte od štátia vyvinutých dvoch pravých listov do začiatku opadu listov pred dormanciou (BBCH 12 - 89).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOV NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsobu aplikácie nevzniká riziko fytotoxicity. Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín. Prípravok je vhodný do systémov integrovanej ochrany rastlín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinný biologický organizmus *Bacillus subtilis* kmeň QST713 je zaradený podľa klasifikácie FRAC do skupiny F6 pod kódom 44 a rezistencia naň nie je známa.

Vzhľadom na charakter prípravku je riziko vzniku rezistencie veľmi nízke a špecifické opatrenia proti vzniku rezistencie sa neuplatňujú.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nebol zistený negatívny vplyv na následné, náhradné ani susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zistený vplyv na necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opäťovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač vycistite nasledujúcim postupom ihneď po aplikácii, inak hrozí riziko, že zvyšky postrekovej tekutiny v postrekovači alebo jeho častiach zaschnú a budú sa ďaleko odstraňovať.

1. Vystriekajte všetky zvyšky postrekovej tekutiny na ošetrovanom pozemku.
2. Demontujte sacie, výtlacné a tryskové filtre a dôkladne ich vycistite vo vode.
3. Napľňte postrekovač vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže a postrekovač dôkladne prepláchnite (použite rotačnú čistiaci trysku, pokial je nainštalovaná).
4. Vystriekajte výplachovú tekutinu na práve ošetrenom pozemku.
5. Vypláchnite postrekovač ešte raz opakováním kroku 3 a 4.
6. Znovu skontrolujte filtre a odstráňte z nich všetky prípadné zvyšky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jest' a ani fajčiť!

Po umytí ošetríte pokožku rúk reparačným krémom.

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zásadách bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a prvej pomoci:

Všeobecné pokyny: Pri pretrvávajúcich zdravotných ďalškostach (slzenie, začervenanie, pálenie očí alebo pri podezrení na alergickú reakciu; a pod.) alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety alebo bezpečnostnej karty.

Pri nadýchaní: Pri nadýchaní postihnutého ihneď odvedťte na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcich ďalškostach vyhľadajte lekára.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcim dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcim dráždení oka vyhľadajte lekára.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypíť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. O ďalšom postupe sa poradťte s lekárom alebo Národným toxikologickým informačným centrom.

Ďalšie údaje: Poznámka pre lekárov: Nepredpokladajú sa závažné nežiaduce účinky. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č. +421/2/5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 4 do + 20°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.