

**LIQUIFIX<sup>MC-™</sup> Glycine**  
pomocný rastlinný prípravok

**Dovozca:** Blumeria consulting, s.r.o., Ľ. Okánika 590/4, 949 01 Nitra, Slovensko

**Výrobca:** Legume Technology Ltd., Units 3C & 3D, Eastbridgford Business Park, Kneeton Road, Eastbridgford, Nottinghamshire NG13 8PJ, Veľká Británie

**Číslo rozhodnutia o registrácii:** Česká republika, rozhodnutia o registrácii číslo 4675

**Mikrobiologické vlastnosti:**

Počet KTJ *Bradyrhizobium japonicum* sp. v 1 g min.  $3 \times 10^9$

**Obsah rizikových prvkov,** spĺňa zákonom stanovené limity Českej republiky v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, ortuť 1, arzén 20, chróm 50,

**LIQUIFIX<sup>MC-™</sup> Glycine** je pomocný rastlinný prípravok na báze hľuzkových baktérií *Bradyrhizobium japonicum* sp. určený na inokuláciu sóje pred siatím. Prípravok prispieva k zlepšeniu vzhádzania a tým k zvýšeniu výnosu.

**Rozsah a spôsob použitia:**

Aplikácia v násypke sacieho stroja – pred otvorením pretrepte obsah vrecúška a prípravok rovnomerne naneste na osivo. Následným riadnym premiešaním dosiahnete rovnomerné pokrytie semien osiva.

Aplikácia moriacim zariadením – pred otvorením pretrepte obsah vrecúška a prípravok rovnomerne naneste na osivo pomocou dávkovača s riadeným výtokom potrebného množstva prípravku. Vrecúško s prípravkom zaveste tak, aby hadica dávkovača bola priama a vyústila tesne nad ošetrovaným osivom. Prietok prípravku dávkovačom nastavte tak, aby zodpovedal výkonu moriaceho zariadenia.

Dávka prípravku ml/min.	Výkon moričky kg osiva/min.
300	100
600	200
900	300
1 200	400

Maximálne pokrytie povrchu osiva prípravkom sa dosahuje pri 50 % kapacite moriaceho zariadenia. Priebežne vyhodnocujte aplikačnú dávku v nadväznosti na skutočnú prietokovú rýchlosť osiva moriacim zariadením.

**Odporúčané dávkovanie:**

Jedno balenie, t. j. 3 l prípravku, je určené na 1 000 kg osiva.

Prípravok spotrebujte v priebehu 24 hodín po otvorení obalu a výsev urobte čo najskôr po inokulácii, najdlhšie však do 7 dní. V prípade dlhšieho časového zdržania (viac než 7 dní) inokuláciu osiva opakujte. Pri aplikácii je nutné prípravok aj inokulované osivo uchrániť pred priamym slnečným žiarením.

Prípravok je možné aplikovať na už namorené osivo moridlami na báze účinných látok, napr. *carbathiinu*, *metalaxylu*, *captanu*, *thiramu*, *thiabendazolu*, *streptomycinu*, *carboxinu a pod.* Dodržujte bezpečnostné pokyny pre prácu s moreným osivom. Pred použitím sa odporúča konzultácia s výrobcami moridiel.

**Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:**

Pri manipulácii s prípravkom je potrebné zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci a je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce si vždy starostlivo umyte ruky vodou a mydlom a kožu ošetríte regeneračným krémom.

**Prvá pomoc:**

Pri nadýchnutí: Vyveďte postihnutého okamžite zo zamoreného priestoru a zaistite mu dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Oči premývajte najmenej 15 minút tečúcou vlažnou vodou pri násilne otvorených viečkach. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Pri styku s kožou: Zasiahnuté miesto ihneď umyte teplou vodou a mydlom a dobre opláchnite.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou, dajte vypiť asi 0,5 l vody a vyhľadajte lekársku pomoc a lekárovi predložte etiketu prípravku. Nevyvolávajúce vracanie. Požitie prípravku môže vyvolať bolesť v tráviacom trakte.

Pri vdýchnutí: Odstráňte zdroj, pri poleptaní slizníc vyhľadajte lekára.

**Podmienky skladovania:**

Prípravok skladuje pri teplote v rozmedzí od 5 °C do 15 °C mimo priameho slnečného svitu. Nepoužívajte prípravok po záručnej lehote alebo prípravok uskladnený v nevhodných podmienkach. Uchovávajte mimo dosahu detí.

**Výrobok sa dodáva balený. Objem balenia:** 6 x 3 l v papierovom kartóne  
**Lehota použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok

**Dátum výroby:**

**Číslo výrobného šarže:**