

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OPTIMUS®

Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentráту (EC) určený na reguláciu rastu a vývoja pšenice ozimnej a jačmeňa jarného a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

Typ prípravku na ochranu rastlín: **regulátor rastu**

ÚČINNÁ LÁTKA:

Trinexapac **155,5 g/l** (t. j. vo forme trinexapac-ethyl s obsahom 175 g/l
(15,3 % hm) (17,2 %))

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: trinexapac-ethyl CAS: 95266-40-3, mastné alkoholy, polyglykolétery, 4-metyl-1,3-dioxolán-2-ón CAS: 108-32-7, kyselina dodecylbenzénsulfónová, zlúčenina s izopropylamínom CAS: 26264-05-1.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS07

Pozor

- | | |
|--------------------|--|
| H315 | Dráždi kožu. |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P280 | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| P302 + P352 | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. |
| P305 + P351 + P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných odpadov. |
| EUH 401 | Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. |
| SP1 | Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). |
| Z4 | Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. |

- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo2** Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:	NUFARM GmbH & Co KG St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz Rakúska republika
Číslo autorizácie ÚKSÚP:	18-00323-AU
Dátum výroby:	uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže:	uvedené na obale
Balenie:	1 l coex HDPE/EVOH alebo f-HDPE alebo coex HDPE/PA fľaša 5 l coex HDPE/EVOH alebo f-HDPE alebo coex HDPE/PA kanister

OPTIMUS® je reg. ochranná známka spoločnosti Nufarm

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok OPTIMUS® obsahuje rastovo regulačnú účinnú látku trinexapac-etyl, ktorá inhibuje biosyntézu gibberelínov, čo vedie k redukcii predĺžovacieho rastu internódií a redukcii výšky obilnín. To spolu so zväčšením priemeru stebľa vedie k odolnosti ošetrovaných rastlín proti poliehaniu a zachovaniu vysokej kvality úrody. Účinná látka je prijímaná predovšetkým prostredníctvom zelených častí rastlín a je rozvádzaná akropetálne do rastlinných pletív, prevažne do oblastí rýchleho vegetatívneho rastu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	
jačmeň jarný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha

S cieľom dosiahnutia optimálneho účinku prípravok OPTIMUS® aplikujte za vhodných svetelných a teplotných podmienok za predpokladu, že sú porasty obilnín dobre založené, dobre vyhnojené a očakáva sa vysoká úroda. Porasty určené na ošetrovanie by mali byť suché (pozor na rosu) a denná teplota by mala byť vyššia ako 12 °C. Ak sú poveternostné podmienky nevhodné (chladno, prípadne dážď), alebo existuje riziko nočných mrazov, ošetrujte neskôr. Rovnako to platí aj pre prípad vysokej teploty (viac ako 27 °C). Oneskorenie aplikácie nespôsobuje žiadne problémy, nakoľko interval použitia prípravku OPTIMUS® je dostatočne široký od štádia 1. kolienka do štádia vlajkového listu (BBCH 31-39). Ak je sucho a je vysoká denná teplota, prípravok aplikujte vo večerných hodinách. Prípravok OPTIMUS® nepoužívajte v prípadoch, keď je porast nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný, napríklad suchom. Odolnosť voči dažďovým zrážkam je 2 hodiny po aplikácii. Poľahnutie porastu spôsobené nepriazňou počasia (silné zrážky a vietor) nemožno vylúčiť.

Pre zabezpečenie optimálneho účinku proti poľahnutiu, použite OPTIMUS® už v rastovej fáze BBCH 31-33. Prípravok OPTIMUS® môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do rastovej fázy BBCH 39. Najmä v prípadoch, keď sa riziko poľahnutia porastu prejavilo v neskorších fázach (napr. intenzívnejší rast, nesprávne rozhodnutie o nepoužití regulátora rastu, atď.)

Ošetrujte max. 1 x za vegetáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI, A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsob aplikácie nevzniká žiadne riziko fytotoxicity. Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín vrátane susedných. Prípravok OPTIMUS® neovplyvňuje procesy spracovania, fermentácie a nemá negatívny vplyv na klíčivosť alebo životaschopnosť semien určených na množenie. V prípade tank mix kombinácií s prípravkom OPTIMUS® musia byť dodržiavané odporúčania pre použitie tank mix partnera.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko vzniku rezistencie ošetrovaných obilnín voči účinnej látke trinexapac-etyl sa považuje za nízke. Nevyžadujú sa žiadne antirezistentné opatrenia.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je nutné obilniny ošetrované prípravkom OPTIMUS® zaoberať, náhradné plodiny možno vysievať resp. vysádzať bez obmedzenia. Vysievanie alebo vysádzanie následných plodín v osevom postupe je rovnako bez obmedzenia. Prípravok OPTIMUS® sa v pôde rýchlo rozkladá. Prijem koreňmi rastlín je obmedzený. Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou

postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri aplikácii použite ochranný pracovný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú filtračnú masku alebo ochrannú rúšku na tvár.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite!

Prípravok aplikujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

OPTIMUS® nie je horľavinou.

Pri požiarnom zásahu vždy použite uzavretý dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev pre možný vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov. Pri tepelnom rozklade môžu vzniknúť nebezpečné oxidy síry, dusíka a uhlíka. Vhodné hasiace prostriedky: nehorľavé, prispôbte okoliu. Nevhodné hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov: podľa okolia. Voda použitá na hasenie by nemala uniknúť do kanalizácie alebo životného prostredia.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:

Dodržiujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené v etikete. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z etikety alebo bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.

Pri nadýchaní:

Postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí vyhľadajte pomoc lekára. Pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri styku s pokožkou:

Zasiahnutý odev čo najrýchlejšie odstráňte. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí:

Pri nasilu otvorených viečkach vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý kontaktné očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití:

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie!

V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu.

Poznámka pre lekárov: Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č.: +421(2) 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 0 do +35 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.