

Účinok:

- doplnenie nedostatku síry a dusíka (podporuje vstrebávanie dusíka)
- má význam v oxidačno-redukčných procesoch rastlín, v aktivácii enzýmov
- podporuje dostupnosť živín z pôdy (P, Fe, Mn, Cu, Zn, B..)
- dezinfikuje povrch rastlín

Dávkovanie:

Plodina	Dávka (l/ha)	Termín aplikácie
Obilniny, olejniný	1,0 – 2,0	Od 3 – 4 listov až do nasadenia kvetov, aj niekoľko dávok, do konca predĺžovacieho rastu
Zelenina (najmä kapustovité)	1,0 – 3,0	Od 3 – 4 listov každých 7 – 10 dní
Ovocné sady, vinič	3,0 – 5,0	Pri dostatočnom olistení, aj niekoľko krát

Zloženie:

Síra (SO ₃)	871,7 g/l	65%
Dusík (N)	160,9 g/l	12%
pH	7,0 – 8,0	

Použitie:

Najväčší efekt dosiahnete pri použití v olejninách (repka, slnečnica), obilninách, viniči, ovocí, zelenine. Aplikácia možná ku každému postreku v množstve 1 – 2 l/ha, maximálne 10 l za celú vegetáciu.