

BOROHUMINE 100

Listové hnojivo s obsahom bóru ako bóretanolamín s prídavkom humínových látok.

ZARADENÉ DO ZOZNAMU VZÁJOMNE UZNANÝCH VÝROBKOV

BALENIE:
20 l kanister

ZLOŽENIE:

B 8%, humínové látky

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využiteľného bóru v rastlinách a ako prevencia pred stresovými podmienkami (sucho, mráz, predávkovanie chemikáliami), stimuluje tvorbu koreňových vlákien.

Obsiahnuté humínové látky, ktoré sú vo vodorozpustnej forme, pozitívne ovplyvňujú príjem živín, ktoré hnojivo

obsahuje. Okrem rýchlosti ich príjmu súčasne ovplyvňujú aj ich využitie. Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri nižšej intenzite svetla, čím prispievajú k vyrovnanej energetickej bilancii v rastlinách. Následkom toho sa stimuluje tvorba koreňového vlásenia a dochádza k lepšiemu príjmu živín koreňmi. K takýmto náročným plodinám patria: repka, mak, slnečnica, sója, cukrová repa, jadrové ovocie, vinič a okrasné kvetiny.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE

Plodina	Dávkovanie l/ha	Obdobie aplikácie	Počet aplikácií
Repka ozimná	2–3	1. aplikácia: jeseň 4 – 6 listov 2. – 3. aplikácia: na jar, až do fázy butonizácie	1–3
Cukrová repa	3	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ružice 2. aplikácia: v 14-dňovom intervale	2
Mak, slnečnica, horčica	2	1. aplikácia: 4 – 8 listov do začiatku kvitnutia	1–2
Sója	1–2	1. aplikácia pred kvetom	1
Vinič	3	1. aplikácia pri otvorení púčikov 2. pri rastu plodov v 14-dňovom intervale	3